



Симптомы туберкулеза – НЕСПЕЦИФИЧНЫ!

1. Кашель с мокротой более двух-трех недель без объяснимых причин.
2. Наличие крови в мокроте.
3. Повышение температуры тела в вечернее время до 37,0-37,5.
4. Усиленное потоотделение (особенно ночью).
5. Слабость, снижение массы тела.


Туберкулёз (от лат. *tuberculum* — бугорок) — широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий (или иначе палочками Коха). Возбудитель открыт 24 марта 1882 года Робертом Кохом.





Пути передачи от человека к человеку.


1. Основной: ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЙ (при разговоре, чихании).
2. Также возможна передача инфекции через мясо и молоко больных животных.





Что поражает микобактерия туберкулеза:

1. Наиболее часто: легкие
2. Туберкулез может поражать ЛЮБЫЕ органы.
Наиболее распространенные внелегочные локализации:
 - центральная нервная система,
 - лимфатические узлы,
 - кости и суставы.





Профилактика

Специфическая:

1. Вакцинация БЦЖ или БЦЖ-М (Первая в роддоме на 3-е сутки после рождения, ревакцинация в 6-7 лет).
2. У детей до 14 лет ежегодная иммунодиагностика.
Реакция Манту – 1 раз в год с 1 года до 8 лет.
Диаскинтест – 1 раз в год с 8 лет до 15 лет.
С 15 лет приоритет – флюорографическое обследование.
3. Взрослые – ежегодное флюорографическое обследование.

Неспецифическая профилактика:

1. Здоровый образ жизни, повышение иммунитета.
2. Отказ от курения.
3. Соблюдение личной гигиены – индивидуальная посуда и средства личной гигиены.
4. Регулярная влажная уборка.





Группы риска по развитию туберкулеза:

- лица, которые 2 года и более не проходили флюорографические осмотры;
- лица с эндокринными заболеваниями и поражением желудочно-кишечного тракта;
- лица, страдающие хронической обструктивной болезнью легких;
- лица, получающие иммуносупрессивную терапию, в том числе глюкокортикостероиды и ГИПБ;
- лица, живущие с ВИЧ-инфекцией;
- лица, освободившиеся из системы ФСИН;
- лица БОМЖ, мигранты.





Что делать, если у Вас появились симптомы?

Необходимо обратиться к участковому терапевту по месту жительства для дообследования и проведения флюорографического обследования. При наличии показаний, Вам выдадут направление к фтизиатру в противотуберкулезный диспансер.

Лечение назначает ВРАЧ-ФТИЗИАТР!

Больше информации на сайте организации
рпдд-карелия.рф